DOI: 10.24875/AMH.25000035

Alerta de Vía Aérea Difícil (SW884) — Formato de alerta y registro

Documento de alerta clínica y registro estandarizado

Identificación del paciente

Episodio _____

Nombre completo _____

Fecha de nacimiento ____/____/_____

Sexo ☐ M ☐ F

Resumen del manejo de la vía aérea. **Fecha de la intervención:** _____/_____/_____

Tipo ☐ Electiva ☐ Urgente

Motivo de la intervención _____

¿Se predijo la dificultad? ☐ Sí ☐ No Detalles:

_____

Ventilación con mascarilla facial

Valoración: ☐ Fácil ☐ Difícil ☐ Fallida ☐ No intentada

Capnografía (mejor): ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Método: ☐ 1 mano ☐ 2 manos ☐ OPA ☐ NPA

Comentarios:

Ventilación con dispositivo supraglótico

Estado: ☐ Fácil ☐ Difícil ☐ Fallida ☐ No intentada

Comentarios:

Intubación traqueal

Estado: ☐ Fácil ☐ Difícil ☐ Fallida ☐ No intentada

Comentarios:

Laringoscopia directa (Cormack–Lehane, mod.)

Grado: ☐ 1 ☐ 2a ☐ 2b ☐ 3a ☐ 3b ☐ 4 ☐ No intentada

Comentarios:

Videolaringoscopia

Tipo: _____ Hoja: _____ POGO (%): _____

Ayudas usadas: ☐ Bougie ☐ Estilete ☐ Broncoscopio ☐ Ninguna Otra: _____

Comentarios:

Bloqueador neuromuscular (NMB) utilizado

☐ En VM con mascarilla ☐ Con dispositivo supraglótico ☐ En laringoscopia directa ☐ En videolaringoscopia

Detalles:

_____

Acceso por la cara anterior del cuello (FONA)

¿Se intentó FONA? ☐ Sí ☐ No Detalles:

_____

Equipo y técnicas utilizadas (incluya posicionamiento y factores contribuyentes)

Imágenes de referencia

Imagen 1: Clasificación de la ventilación con mascarilla según la mejor capnografía. (Adaptado de Lim y Nielsen. Br J Anaesth. 2016;117(6):828-9).



Imagen 2: Clasificación de la laringoscopia directa según la modificación de Cook de la puntuación de Cormack y Lehane. (Adaptado de Cook. Anaesthesia. 1999;54(5):496-7).



Grado	Descripción
1	La mayoría de las cuerdas vocales son visibles
2a	Parte posterior de las cuerdas vocales visible
2b	Solo aritenoides visibles
3a	Epiglotis visible y elevable
3b	Epiglotis visible y adherida
4	No se visualizan estructuras laríngeas

Imagen 3: La puntuación del porcentaje de apertura glótica (POGO) representa la porción de la glotis visualizada. (Levitan et al. Anestesia. 1999;54(10):1009-10).



Copias y acciones

Copias de la carta: ☐ Paciente ☐ Expediente clínico ☐ Médico(a) de AP ☐ Dept. Anestesia

Acciones: ☐ Conversación con paciente ☐ Registro anestésico completado ☐ Alerta en expediente